Lista kontrolna przed podaniem produktu

Materiały edukacyjne dla fachowego personelu medycznego, pacjentów i opiekunów

Do zapoznania się przed podaniem produktu leczniczego TYSABRI™ we wstrzyknięciu podskórnym (s.c.) w warunkach pozaszpitalnych

---

U pacjentów, którzy otrzymywali produkt TYSABRI, wystąpiła postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (ang. *progressive multifocal leukoencephalopathy*, PML), rzadko występujące zakażenie mózgu. Listę kontrolną przed podaniem produktu w warunkach pozaszpitalnych opracowano, aby ułatwić identyfikowanie objawów przedmiotowych i podmiotowych PML przed podaniem produktu Tysabri we wstrzyknięciu podskórnym. Lista kontrolna nie zastępuje lokalnie wymaganej kontroli stanu zdrowia pacjenta poprzedzającej podanie produktu ani badań przesiewowych przeprowadzanych przez osoby należące do fachowego personelu medycznego.

Przed wypełnieniem listy kontrolnej:

- **Osoby należące do fachowego personelu medycznego** powinny zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) produktu TYSABRI s.c. oraz Dodatkowymi informacjami dla fachowego personelu medycznego.
- **Pacjenci i opiekunowie** powinni zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania oraz Karty Ostrzegawczej pacjenta.

LISTA KONTROLNA PRZED PODANIEM PRODUKTU			
#	**PYTANIE**	**JEŚLI NA <u>KTÓREKOLWIEK PYTANIE</u> ODPOWIEDZIANO TAK**	**JEŚLI NA <u>WSZYSTKIE PYTANIA</u> ODPOWIEDZIANO NIE**
1	Czy od czasu przyjęcia ostatniej dawki produktu TYSABRI wystąpiły u Pana/Pani nowe objawy lub nastąpiło pogorszenie następujących objawów? • zmiany w zakresie sprawności umysłowej lub koncentracji • zmiany w zachowaniu • osłabienie jednej strony ciała • zaburzenia widzenia	⊗ **NIE** podawać produktu TYSABRI we wstrzyknięciu podskórnym.	✓ Można podać produkt Tysabri we wstrzyknięciu podskórnym.

Data zatwierdzenia: 21.08.2025

	• nowe, nietypowe objawy dotyczące mózgu lub układu nerwowego	Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalistą.	
2	Czy od czasu przyjęcia ostatniej dawki produktu TYSABRI zdiagnozowano u Pana/Pani nowe schorzenie lub wykonano zabieg chirurgiczny, które mogą osłabiać układ odpornościowy?		
3	Czy od czasu przyjęcia ostatniej dawki produktu TYSABRI przyjmował Pan/przyjmowała Pani leki na stwardnienie rozsiane (SM) lub inne leki, które mogą osłabiać układ odpornościowy?		